

ICHTHYOLOGIA, CUM  
AMPHIBIIS REGNI  
BORUSSICI. METHODO  
LINNEANA DISPOSITA, A  
JOHAN. CHRISTOPH...

Johann Christoph Wulff



# 4 ICHTHYOLOGIA,

CUM

AMPHIBIIS

REGNI BORUSSICI

METHODO LINNEANA

REPERTA,

A

JOHAN CHRISTOPH WULFF,

MDA DOCT.



---

REGIOMONTI,


Apud JOHAN JACOB KANTER.

MDCCCXXXV.

In contemplatione Naturæ, nihil  
supervacuum.

*PLIN.*

## PRAEFATIO.

nchyologiam Baragiscam cum An-  
pōibile jamjam promissam, Can-  
dide Lectori, hisce pagellis exhibeo.  
Opusculum mole quidem parvum, q̃  
multo labori natum. Etiam antequam  
canite neque una Natura scrutator  
Incolarum aquaticorum Regni Baragiae,  
Piscium scilicet, usque pervenit. Hinc  
conatus sum persequi digestis sum, cul-  
que, cum magno operi corpore, uter  
meas nequaquam sufficeret esse, acriter  
intendi acrius. Insuper notius diffi-  
cultas, deficiantibus specialibus piscium

# PRAEFATIO.

*ut variantibus eorum denominationibus  
 laborata est. Erbar. se. se habentibus  
 ingreditur inferendi Notarum Cuiusque  
 fere sufficiens erat. Tandem bene-  
 volis Factores ut Anici hoc in se amicum  
 non erat lepidus. Hi non solum premi-  
 serunt, sed Speciales etiam pifcium li-  
 beraliter colligerant atque peropportune  
 transmissant. Inter hos magnam na-  
 vant operam in colligendis Speciminibus  
 Fir Flor. Reverend. Do. Carol. Filder,  
 Gerdaar, Missus Perbi Digni in Ceta  
 Gylgraff, cum deotus admirator Samu-  
 Numbis Opera. Hinc Et gratiarum  
 actionem publice ago. Benignum est (ait  
 Plinius in Epistola ad V. Gylgraffum) ut  
 plerumque*

# PRÆFATIO

*plurima ingenui pudoris, fateri per quos  
proficimur.*

*Acceptis ergo Speciminibus, B. c. D.  
incepti colligere, disponere ac classificare  
secundum characteres & descriptiones  
clare docti Ichthyologi Artedii pſces  
tracaviſſis. Interim ordinem & diſpoſi-  
tionem in Genera & Species Mucini,  
ſubtriſſini ac Induſſi Exploratoris re-  
gnorum Naturæ, Perithyſtris Do. Epit-  
etis aveti de Lione &c. &c. in Syſtemate  
ſuo Naturæ ſtabilitatem preſſo pede ſecutus  
ſum. Præterea reliquis brevibus verbis  
mutatis antores & hoc in ſpſculo citatos  
ſequenti pagina appoſui. Interim tamen  
atque ſpero, fore, ut aliquando veniſto-*

# PRÆFATIO.

*res studii Historiæ Naturalis Patriæ,*  
*quibus plus otii, occasione ac eruditio-*  
*nis est, bene instructam Ichthyologiam*  
*Baragistræ qualemcumque, hinc in pagi-*  
*næ etiam atque, meliorem, ampliorē red-*  
*dant utque eleviter continuent, quia*  
*inventis facile est aliquid addere. Lector*  
*Benevole vale ac fratre bisce parcis, non*  
*res a conatibus plerumque non ab offensi-*  
*bus judicatur: utque ab animi sententia*  
*et voluntate, non a fac, coram militat.*  
*Cum Iphigeneia Præsiosa, Libr. 3. Epist.*  
*359. prælorea.*

*Prælorea, Epist. Prælorea*  
*in. Prælorea, 1789.*

Occa-

*Ocras foret peragportans, innocen-*  
*tem Floram contra insidietiones inopi-*  
*des frivolorum calumniantium, impu-*  
*dentium tacetorum & inficiorum pro-*  
*phanorum hic defendere. Nota. Pa-*  
*cem dilige. Latus eoque recorder*  
*receptionis hercule Clarissimum ac*  
*Dilectissimum Pium, in studio Histo-*  
*rie Naturalis versatissimum. Interim*  
*Extractum Epistolae Amici Honoratissimi*  
*& ab eodem cum animi ad cinerem atque*  
*Dilectissimi loco defensionis esse.*



*FREUND: der mit Hingebtheit die redliche  
Mens. vertheid,  
läßt kein der Dürchbruch Schwung, der nur  
sein Herz ergötzt,  
wenn Dich der Noth umschloß; bist Dich ein rein  
Greisfein,  
wenn Dich der Falsch schlingt, wird Dich der  
Kummer küssen.  
Dein redliches Bewußt, der nur der Thor ver-  
kennt,  
wird von des Falsch einß der Nachwelt nicht  
gekannt,  
Du kennst die Natur, die Schöpfer nicht ver-  
sehen,  
wenn sie in Kleinen nie den großen Schöpfer  
sehen,*

das unerschöpfte Land steht dem Arz-  
neyen,

man führt in Preußen sich ein prächt'g' Land  
zu sehn.

O meine FREUND! Dein Fleiß mehr Rath'her  
erleiden,

nicht Preußen würdest Du? sein, das Welt  
verleiden.

und nur die hiege Land erzeuge und er-  
niden,

war ist Dein inner Fleiß zueigender Elva  
werth.

Leß Parient! nur vom Dank für ihn zu-  
stüßigen,

WULFF! lehre Rühre nur erkennen und  
grüßen,

Dem zeigt sich sein Fleiß mit gläub'ger Hand  
hobelt,

Dem ist ein gläub'ger Dank dem von uns An-  
gewandte.

Durch solchen That ist kein großer Mann  
schon klein.

Für Kaiser gleich er liegt, da werden ihn  
verehren — —

---

Agricola

- Agricol. de Nat. Foss. Georg. Agricola de Nat.  
ura Fossilium, Basil. 1546. in Fol.
- Bruch. Wirt. Natur. Christ. Henrici Ernesti  
Wartena physice illustrata, Dord. 1730.  
in IV. cum Fig.
- Hallqv. Nöte och Födel. Friden. Hållqvist,  
Nöte och Födelstax. Jernstuguen van  
Carl de Linné, Sköfud. 1760. in 8vo.
- Joest. Hist. Nat. Psk. Johanni Joestius Hist.  
ria Naturalis Pskorum, Amdt. 1657. in Fol.  
cum Fig.
- Kraus. Elench. Anim. Austr. Gerhard. Henrici  
Krausii Elenchus Animalium per Austrum  
et Vienna 1746. in 8vo cum Fig.
- Linn. Syst. Nat. Caroli Linnæi Systema Natura.  
re, Håle Magd. 1760. in 8vo.
- Ej. Faun. Svec. Caroli Linnæi Fauna Svecica,  
Stockholmæ, 1761. in 8vo, cum Fig.
- Amoen. Acad. Caroli Linnæi Amoenitates  
Academicæ, Lugd. Bat. & Holmiæ, 1749-  
1763. in 8vo VI. Volumina cum Fig.
- Del. Syst. Caroli Linnæi Systema Naturæ Classis  
umæ Systemæ, Gollæ 1764. in 8. c. Fig.
- Syst. Class. Syst. Caroli Linnæi Systemæ Naturæ  
Syst.-Systemæ, Gollæ 1765. in 8vo cum  
Fig.
- Oliv. Gattor. J. S. Thom. Olivii Gattoriphiæ  
Simplicium, Cöphæ. 1666. in IV. cum  
Fig.
- Schæ. Ichthyoch. Joh. Schæ. Classific. Sch.  
um Ichthyochrologia, Epp. 1754. in 8vo  
cum Fig.

Fig.

- Kieg. Inrod. in Not. Rec. Nat. Joh. Christoph.  
 Riegens Inrodactus in Notum Rerum  
 Nuremberg. &c. Hage Com. 1742. 8. 2pp.  
 in IV.
- Koel Ranz. August. Johan. Rösch von Döber  
 Hoff Gärten der Röhre desgen. Gärten.  
 Wism. 1718. in Fol. Fig. illum.
- Schell. Pfl. Bon. Pont. Jacob. Christ. Schaffel  
 Pflanz. Bavaricae. Karthensianum Pontis,  
 Barchon. 1762. in IV. Fig. illustrat.
- Schwenk. Theodor. Nels. Casper. Schwenk-  
 felds, Theatropheum Sclae, Lignici,  
 1803. in Qa.
- Seb. de Alra. Michaelis. Sebati de Alimenta-  
 rum Facultates, Augst. 1690. in IV.
- Swam. Tib. Johan. Swammerdam. Tibel von  
 Natur, Zerp. 1752. in Fol. cum Fig.

AMPHI-



## AMPHIBIA.

**P**essima tetraque Animalia Corde uniloculari uniaurico Pulmonibus arbitraria, Pene duplici digressantur.

Amphibia plerumque horrent Corpore frigido, Colore lurido, Sceletocartilagineo, Cuius feda, Facie torva, Obtutu meditante, Odore tetra, Sono rauco, Loco squalido, Veneno horrendo.

A

GENE-

# GENERUM CHARACTERES.

## I

REPTILES PEDATI, spirantes ore.

- 1) Testudo, Corpus Testis maximum.
- 2) Lacerta, Corpus medium, caudatum.
- 3) Rana, Corpus similitudo medium, elongatum.

## II

SERPENTES APODES, spirantes ore :

- 1) Coluber, Seta Abdominalis Squamæ Caudales.
- 2) Anguis, Squamæ Abdominales, Caudalesque.

## III

NANTES PINNATI, spirantes lateribus.

- 1) Pteronotus, Spiracula VII.
- 2) Aspidon, Spiracula I. Os intra-  
bile.

REPTIL.

## REPTILES.

## 1.

## TESTUDO.

Os respirans.

Podcs quatuor.

Corpus Caudatum, testa obtusum.

Testudo Orbiculata, pedibus palmatis, testa orbiculata planiuscula, Linn. Syst. Nat. p. 300.

Testudo aquae dulcis, Jonst. Hist. Quadr. p. 146. Tab. 80. no. 3.

Cist. Edulis-Eris, Testa-Eris, Schwenk. Thesaur. 3d. p. 164.

In Oriente aut in China, in Sibirie in Europa.

Hic in terra russici testudines in castris cultivari assueverunt, in quibus jumentis pro pecunia colliguntur, ut porcationes porcos inde melius proficiat & pasquellius. In quatuordecim hibernis ducunt per bosnam & ultra viant.



## L A C E R T A.

Corpus tetrapodum caudatum, medium.

2.

## PALUSTRIS.

Lacerta cauda anicipiti, medioocri, pedibus  
mutica, fissa, palmas stradalystis, Linn. Syst.  
Nat. p. 202.

Lacerta palustris cauda anicipiti brevioribus,  
pedibus mutica fissa, membris stradalystis,  
Linn. Faun. Suec. no. 281.

Salamanca aquaticus Rafi.

Lacerta Arvensis Seba.

Lacertus Jossi Hüb. Quadrop. Tab. 76.

Lacertus aquaticus major, Gmelin Hefen-  
spiegel.

Schwarzk. Theriograph. Tafel p. 149.

In foveiculis limpidis, fissa, apria flagran-  
tibus habitans.

3.

## AGILIS.

Lacerta cauda verticillata, longiuscula sym-  
metra acuta, collata libris symmetra confusio,  
Linn. Syst. Nat. p. 203.

Linn. Faun. fr. no. 284.

Lacert-

*Lacerta belliana.* Ein gelber Eidech.  
Gelber Eidech. Schmidt Thierreich.  
Skt. p. 148.

Eidech.

Iner lapides hinc inde obstat. Hinc  
habitat in cavernis.

4

# VIRIDIS.

*Lacerta viridis Aldrovandi.* Linn. Syst.  
Nat. p. 303.

Linn. Faun. Sc. nro. 384.

Grün Eidech. Jughäutlein, Schmidt.  
Tent. Sk. p. 148.

In prae caecis copiosa.

5

# VIRIDIS PUNCTIS ALBIS.

*Lacerta dors punctis albis duplici serie.*  
Linn. Fa. Sc. nro. 384.

Ein gelber Eidech mit weißer Fleckpunkt auf  
dem Rücken.

Iner clava. In prae humida.

6

# VULGARIS

*Lacerta cauda teret, mediocri, pedibus mucis.* Linn. Syst. Nat.  
p. 306.

A 3

Lacerta

*Lacerta vulgaris* cauda brevi mediocri, pedibus unguiculatis filis, maribus ootridactylis, palmis perradactylis. Linn. Faun. Svec. no. 183.

*Lacerta cinerea*. *Lacerta vulgaris*. Cuius generis etiam generum Stenoph. Schwenck. Ther. Sild. p. 149.

In fylis, domatibus rusticorum & rupibus habitans. Torrida loca amans.

## 7.

## AQUATICA.

*Lacerta cauda truncatula* mediocri, pedibus mucronatis filis, palmis ootridactylis. Linn. Syst. Nat. p. 226.

*Lacerta aquatica* cauda truncatula mediocri, pedibus mucronatis filis, maribus ootridactylis, plantis perradactylis. Linn. Faun. Svec. no. 183.

*Lacerta aquatica minor*, seu *lavinia* flavescens. Gels. Ovipar. 31.

*Lacerta palustris minor*. Cuius fides Stenoph. Schwenck.

Schwenck. Theriograph. Sild. p. 149.

In paludibus & humida, quodvisque locis, in alutis &c. vitam degit.

## BANA.

# RANA.

Corpus tetrapodum, nudum, caudatum.

8.

## BUFO.

Rana corpore verrucoso, verrucoso, luteo fuscisq. Linn. Syst. Nat. p. 210.

Linn. Faun. Svec. no. 375.

Bufo. Cuv. Hist. Nat. Hist. Quadrup. Tab. 75.

Bufo terrestris major. Cuv. Hist. Nat. Hist. Quadrup. Tab. 75. Bufo terrestris minor. Cuv. Hist. Nat. Hist. Quadrup. Tab. 75. Bufo terrestris major. Cuv. Hist. Nat. Hist. Quadrup. Tab. 75. Bufo terrestris minor. Cuv. Hist. Nat. Hist. Quadrup. Tab. 75.

Horridum hoc animal ubique notissimum.

9.

## VARIEGATA.

Rana corpore verrucoso, rhodocenta albo nigro-maculato, picea guttata. Linn. Syst. Nat. p. 211.

Rana Bombina rhodocenta felva. Linn. Faun. Svec. no. 377.

In agilis palea elata. Inprimis copiose videntur, quando palea mutare incipiunt. An palea eis pro oia?

'80.

## RUBETA.

Rana corpore verrucoso, ano obruto sub-  
ras quadrata.

Linn. Syst. Nat. p. 212.

Linn. Faun. Svec. nro. 276.

Bubo palustris major, Rubera Lacustrum,  
Bubo aquaticus venenosa. Quid. Hist. Nat. Bæ-  
th. Scia. Sam. Juss. Schwed. Thierart.  
Säls. p. 162.

In agris Regiaribus & lacubus circa Re-  
giummum pallos.

II.

## TEMPORARIA.

Ranunculo plantaculo subangulato. Linn.  
Syst. N. p. 212.

Rana musculus tetrachetyla fissa, plectis  
hexachetyla palmata, pollicis longior. Linn.  
Faun. Svec. nro. 278.

Rana Jonk. Hist. Quid. Tab. 75. nro. 5.  
& 7. 8.

Rana temporaria, Regia-Jussia. Quid.  
Jussia.

In hortis, pomariis, campis arboribus.

12.

12.  
ESCULENTA.

Rana corpore angulato, dentibus vix gib-  
bo, abdomine marginato. Linn. Syst. Nat. p. 212.

Linn. Faun. Svec. nro. 179.

Rana viridis aequiva viridis. Rost. Rana.  
p. 51. Tab. 13.

Rana aequiva viridis. Qu. anim. Classif. p. 28.  
Oest. p. 28. Schwenk. Thesaur. Sal. p. 153.  
In fluvia & lacubus ubique obvia.

13.  
ARBOREA.

Rana corpore laevi: fuscus parvis can-  
gulis ruberulatis, pedibus filis: unguitis or-  
biculato-dilatatis. Linn. Syst. Nat. p. 213.

Linn. Faun. Svec. nro. 180.

Rana pedibus filis: unguitibus subrotundis,  
corpore laevi: pedibus angulatis. Linn. Actura.  
Acad. Vol. 1. p. 134.

Fest. p. 28. Jost. Hist. Quadrop. Tab. 75.

Rana arborea. Fest. p. 28. Schwenk. Theo-  
riar. Sal. p. 153.

Deponit sub foliis arborum circa loca pale-  
dosa leg. Jostenskius prope Regimantiam. In  
Olivento leg. Jostenskius copiose habet, Anaco-  
rasia Ranares exstis utique demonstravit  
Swarczewskum in Bullis Natur. p. 312. & seqq.

De Rana eluvientis legi meretur, qui  
habet Scherz, de Aluvientis p. 1052.

## SERPENTES.

Apodes, Ipirantes oct.

## COLUBER.

Scuta abdominalia.

Squamæ subcaudales.

14.

## BERUS.

Berus, Linn. Syst. Nat. p. 217.

Berus Scuta abdominalibus 146. Squamæ  
caudæ 39.

Linn. Faun. Svec. nro. 286.

Linn. Auct. acad. Vol. I. p. 113. nro. 1.

Linn. Oulap. Boia. p. 28.

Vipera, Blainv. Que Sed Blainv. id est Vi-  
pera domesticum, Schrank. Theriogr. 81.  
pag. 166.

Vipera, Juss. Hist. Nat. de Scorp. Tab. 1.

In damolis ac vipera monacha pallia.

15.

## CHERSEA.

Chersia, Linn. Syst. Nat. p. 218.

Coluber Chersia Scuta abdominalibus 150.  
Squamæ subcaudales, 34. Linn. Faun. Svec.  
nro. 285.

Anguis.

*Anguis parvus rubicunda* Aſpang diſſem.  
Klun. 40d.

*Aſpis colore ferrugineo*, Aldrovand. De  
Serpent.

*Reus-Eſſingius*, Knoch. Wiſſ. Abh. p. 60.

*Vipera purpurea*. Das ſchwarze Schor.  
Schwenck. Ther. Seb. p. 167.

*Anguis haec colore rubro ſeu ferrugineo*  
longitudinem pedum Klun. 2. aequat.

Habitat inter ſilices locis paludolis ſeptem  
ſup. Elſaſſie Galliae. In ſe duriſſima, ſiliceſcit  
& vaporeſcit velle & aggravaſcit circa molendinam  
prope Elſingiam artem hoſperat, & quavis  
diebus verno tempore, calis herens & ſeculo  
ſepado viſitant. Ut & in paludolis ſilicibus  
ſup. Elſa. Vires moris herens vel anſuati  
conſuetudine, ſupradem perniciem & ſepe  
artem marium caule & efficit.

16.

## NATRIX.

*Natrix*, Linn. Syſt. Nat. p. 110.

*Coluber Natrix* ſcuto abdominalibus 17n.  
ſpines caule 60. Linn. Faun. Svec. 270. 288.

Eſſend. Int. Oſſif. p. 146.

*Natrix*, Hiſt. N. de Serp. Tab. VII. Joſſiam.

*Vipera danreſſica*. Dieſer Gatt. - ſchwarze,  
Schwenck. Ther. Seb. p. 167.

**Domus**



Dormes habitare subis, & in subulis vac-  
cant, ubi sicut per semetipso hyemale al-  
teratur, hibernant. Sicut autem inter, hinc  
autem accedunt. Est animal Oviparum. Ova  
cuncta membranosa cutaneous, ut globuli  
piscari romane ecclesia additionem, coha-  
rent.

Magna in copia observantur in hoc palus  
Sue, nec defrastrum hoc defrastrum.

## 17.

## PRESTER.

Coluber Prester. Scia ablatissimus 172.  
Squamae caude 32. Linn. Faun. Suec. no. 287.

Viperæ Anglica nigricans. Idem cod.

Viperæ nigra, Schrank. Thesaur. Silp. 267

Die Schlangen. Natur. Gesch. - Schlangen.

Idem cod.

Pedes rufosus & superant.

Flavescens, variegatus amphibia.

In parva celsitate & uliginosa salicaria hoc  
Colub magna in copia habitant.

## ANGUIS.

## ANGVIS.

Squamæ abdominales.

Squamæ subcaudales.

18.

## FRAGILIS.

Fragilis, Linn. Syst. Nat. p. 339.

Anguis fragilis squamis abdominis caudæque 135.

Cecilia, *Blasididid*. Juss. Hist. Nat. Serp. Tab. 4.

Typhlops, Cecilia, a Wind-Worm. Menest.-Fis. Rec. Nat. Britan. p. 208.

*Blasididid* Bonellæ.

Ubique in Sylvis arboribus, maxime sub frutibus Corylorum.

Dum hic Historiam Serpentum Bonellæ indigenarum trado, ad memoriam pedis re-  
laris oppido mea, acervo mentium, haud ex  
opt. Vili Flac. Reverendi, dum viveres, Doct.  
Mag. Georg. Andr. Helwingi, Praepositi An-  
gustbergensi, de Jaculo, qui frondosa arbo-  
rum ramos Theriotrophis Neodornas, vulgo  
Theriotrophs, pro hospite sibi elegit. Per-  
vulgatum est interitibus Historie naturalis, Jacu-  
lis, affusum Africæ regionis solum Natus  
colocandis pro diversario. Hac de materia legi  
memor Doct. Hildrystii Intra in Palesti-  
na,

nam, *Aegyptum* &c. p. 368. Moser Flumina  
 Borussiae quondam Amicantibus, De Domi-  
 salianam Regem affocentem solum &  
 Inferiorem Thierographi, supra dicti, alio  
 vivente tempore. Salutaris Societatis postea  
 Naturae insidisse non refert, in Syria Thierog-  
 raphi serpentem volatantem hospitari, arboris  
 circumdare, utraque curam subrepturum, ab una  
 ad alteram se jactant & ora ac pullos solam  
 in clauum rapere. Hinc proletem historiam  
 molles peritissimas Naturae indagatur, cum facie-  
 rare, dolores, sensusque repudat neque den-  
 det. Salutaris postea demonstrat, Deus ejus-  
 modi jacula terra tortata non decrevisse pro  
 hospite. Quid sit: utraque aereis caelo solum  
 memorata, hoc aequo illic vagante animal  
 hic in terris curissimum aliquot per tempus se-  
 dulo quoniam, ut non inveniant. Ha! eun-  
 dem uno oculi ista jacula tam diu quadras  
 de vario arbore frondosa fuisse vergetis ad  
 finem ludari De. Magistri percipitur &, alia  
 baculo sortito ante faciem posito bestiam  
 creduliter uteretur in utroque deinde interfecta-  
 que. Vir citharizans, citharis ejus ab omni-  
 bus Deis adhaec veneratur, descriptis ejus.

*Longipetens superius : sedans*  
*Castellum murem quos hinc*  
*Colorem murem alio murem murem.*  
*Quos hinc murem, hinc murem murem, parvus.*  
*Et hinc murem.*  
*Et hinc murem murem murem.*

NAN.

## NANTES.

Spiracula lateralia.

Pinne natatorie.

## PETROMIZON.

Spiracula 7. ad latera colli.

Fistula in vertice.

Pinne pectorales aut ventrales nullæ.

19.

## FLUVIATILIS.

*Petromyzon pinna dorsali posteriori regulari.* Linn. Syst. Nat. p. 230. Es. Faun. Svec. 1806. 1807.

*Lampetra fluvialia.* Juss. Hist. Nat. Pôc. Tab. 18. Fig.

*Lampetra* (n. *Mallota*) *lævis*, oculi non  
 non-Ross-Schrenk. Thierver. Bd. p. 434.  
 In *lævis* habitus,  
 Vid. Koen. Elench. Animal. Austr. p. 383.

20.

## BRANCHIALIS.

*Petromyzon pinna dorsali posteriori linearis*, labio oris superiore latus lobato, Linn. Syst. Nat. p. 230.

Petro-

*Ptychozoon branchialis* pinnis dorsalibus po-  
steriore linearibus, latius ceteris latiore postice lobata,  
Linn. Faun. Svec. nro. 391.

Succis Linn.-281.

In flumine hucis & canalis,

21.

## VARIEGATUS.

*Ptychozoon variegatus.*

Mollis scissilis seu vana. Agricola.

Pondus. Qu. Balth. Edm. - 281.

Griffith. Edm. - 281. Griffith. Edm.

Schweinf. Thierien. St. p. 441

Griffith. Griffith. Borealis.

Lampora. Juss. Hist. Nat. Pte. Tab. 28.  
nro. 10.

Vita & contentus est pectus, labris, & ca-  
naliculis sunt longioribus. Dorsum cinctum  
pluribus sordibus, sordibus & maculis transversis  
pungens. Ad latera utraque linea candidissima  
& obscure rubentia pinguentur.

In hucis & canalis aquarum locis & lacu-  
na vixit degit.

Alquando hucarum sordibus scissur.

Ab unice devotus brevi post incolumis  
per unum exit.

Longum per tempus in vitis aqua simpliciter  
impletis ad indicanda compellunt, hucmetri  
infus, allervantur, duque vitis.

ACI-

# ACIPENSER.

Spiracula lateralia solitaria, linearia.

Os sub capite, retrahile, edentulatum.

Girri sub rostro, ante os.

22.

## STURIO.

*Acipenser catus* 4. *Squarus dorsalis* 9.  
Linn. Syst. Nat. p. 237.

*Acipenser Sturio catus* 4. *Squarus dorsalis*  
var. *undulata*, Linn. Faun. Svec. nro. 299.

*Acipenser corporis tuberculis spinosis asperso*  
Artedi. Id. cod.

Sturio, Juss. Hist. Nat. Pelt. Tab. 71. Fig. 89.

Sturio. Goltz. Critiq. Schwed. Theor. 7.  
St. p. 412.

Captus ad litora maris, nec in fluv. Cas-  
pico & Brandenburgensi, in specie prope Pil-  
laviam Pomer. .

23.

## RUTHENUS.

*Acipenser catus* 4. *Squarus dorsalis* 17.  
Linn. Syst. Nat. p. 237.

Linn. Faun. Svec. nro. 300.

Sturio alter Godomensis, Klein. Moll. 4 p. 13.  
Tab. 1. Smeltet Svecia.

Circa litora maris prope Pillaviam captus.

Russ ex ovula hujus piscis Caput conficiunt,  
vulgo Caviar.

B

PISCES.

# PISCES.

## CLASSES PISCIIUM

I.

### APODES.

Muraena.

Anurolytes.

Xiphus.

II.

### JUGULARES.

Gadus.

III.

### THORACICI.

Larus.

Corvus.

Phaenocarpa.

Perna.

Gasterosteus.

IV.

### ABDOMINALES.

Colinus.

Salmo.

Eloa.

Clepea.

Cypripes.

V.

### BRANCHIOSTEGI.

Synbranchia.

APO.

## APODES.

## MURAENA.

Caput leve. Nares tubulosa.

Membrana branchiostega radius x  
ejusque.

Apertura ad pinnas pelliculares.

Corpus testudineum, lubricum.

Pinnae caudæ coordinatae, dorsali an-  
q̃ue.

24

## ANGUILLA.

Maxima maxilla inferiore longiore, corpus  
et uncinare.

Linn. Syst. Nat. p. 245.

Ej. Faun. Svec. nro. 108.

Marcon. Cern. III. Animal. Ital. p. 387.

Anguilla. Jonst. Nat. Pisc. Tab. XXIV.

Anguilla. Schwenck. Thesotr. Sil. p. 415.

Anguilla. Schiz. de Alimena. p. 954.

Pars in canibus fluxa & hucusq̃ hesi-  
tans. Optime nunc in loca Anguillæ  
capitata.

B 2

AMMO.



## AMMODITES.

Caput compressum, corpore angustum.  
 Labium superius duplicatum. Man-  
 dibula inferior angusta acuminata.  
 Dentes acuti. Membr. branchiæ.  
 rad. VII.

Corpus percuticulum, squamis vix  
 conspicuis.

Cauda bifida.

25.

## TOLIANUS.

*Ammodytes* Arnd.

Lin. Syst. Nat. p. 247.

*Ammodytes Tolianus*. Lin. Faun. Svec.  
 nro. 302.

*Tolius* 306. Lin. & Oeland. p. 87.

*Ammodytes*. *Ammodytes*. Sæmæl. Jæst.  
 II. Plac. Tol. XV.

*Ammodytes*. Røp. introd. in Nat. Hæ-  
 Nat. p. 422.

Cum locum maris Bahici deperit locus in  
 ætiosa.

XIPHIAS.

## XIPHIAS

Caput maxilla superiore terminatum,  
rostre ciliatum.

Oc. edentulum.

Membrana branchiof. pinnis VIII.

Corpus teretiusculum.

26.

## GLADIUS.

Xiphias Arnaud Linn. Syst. Nat. p. 148.

Xiphias, Gladius Linn. Faun. Suec. n. 307.

Gladius. Blochsch. Journ. Hist. Nat. 1760.

Tab. IV. nro. 1.

Gladius, Schneidh. Natur. Hist. Suec.

Syst. Nat. p. 42.

Tab. 14. nro. 3.

Hic piscis longioribus 3. pedum interdum  
a nostris piscatoribus in mare saltem cum per-  
nicie, jactatus & struendo diutius retinetur, quo  
virescit incrementum quo, capitur.

Pisciculus nostris Xiphias.

7

B 3

JUGU-

# JUGULARES.

## GADUS.

Caput leve.

Membrana branchiostega rad. VII.  
seriata.

Corpus oblongum, squamis deciduis.

Pinnæ omnes cuti communi vestite;  
dorsales unigue plures: radiis mucicis;  
Pectorales in acumen serenosæ,

27.

## CALLARIAS.

Gadus tripterygius atratus variat, cauda  
integra, media superiore bogata. Linn. Syst.  
Nat. p. 252.

Linn. Faun. Svec. nro. 307.

Aditus variat. Juss. Hist. Nat. Pêc. Tab.  
46. Fig. 4.

Svein Targk. Linn. in Gel. pag.

Dorich. Communis. Pennant. Barossa,  
Eigen. lrr. in Nov. Act. Nat. 96a.  
in mari Edaco.

23.

## LOTA.

*Gadus dypnocyttus*, *marula aquatica*,  
Linn. Syst. Nat. p. 355.

Lein. Faun. Svec. nro. 355.

*Skurus cirro unio in mensa*. Acad.  
Soc. 107.

*Muscula borealis* & *Lacustris*. Jonk. Hist.  
N. Pfc. T. 23. Fig. 4.

*Lota Gallorum*. Jonk. Hist. Nat. Pfc.  
Tab. 29. Fig. 4.

*Muscula borealis*. Gies. Naturg. Öfkon.  
Quappn.

Seberr. de Aliment. p. 222.

Quappn. Borealis.

Den tröskan och den en Cläskan fäst, ut  
& in summa Fingre höllas.

B 4

THO.

## THORACICI.

Caput obtusum. Maxillæ denticulatae.

Membrana branchiost. radiis IV.

Corpus squamis ossis distantibus angulatum. Pinnae ventrales connatae in rostrum.

29.

## LUMPUS.

Cyclopterus corpore squamula ossis angulato. Linn. Syst. Nat. p. 260.

Cyclopterus, Lumpus, corpore squamula ossis angulato.

Linna. Faun. Svec. nro. 320.

Linna. Cat. Pis. p. 122.

Lumpus Anglerum. Juss. Hist. Nat. Pis. Tab. 13. Fig. 1.

Lumpus Balticus seu Scoticus. Gmelin. Cat. Pis. p. 122.

Lump. Hidge. Ichthyosch. pag. 338.

In mari Baltico circa Friesiam.

## COTTUS.

## COTTUS

Caput corpore latus spinosum.

Membr. branchiost. radis VI.

Corpus. 32

## QUADRICORNIS.

Cottus verrucos capitis IV. ossis. Linn.

Syst. Nat. p. 254.

Linn. Faun. Svec. nro. 322.

Cottus quadricornis. Shaw. Fishes. Haskins.

Nat. p. 2.

Habitat in mari Baltico ad Svecia.

Charact. Bonell.

Hoc semper Svecia. Linn. Fa. Sv.

Longitudo corii ab ore ad extremitatem pinnarum cauda usque VII-IX. caput.

Caput pergrande, carnosum, horridum asperum.

Rictus oris valde preparatus, dum boant.

Corpus elevatum, maculatum, compressum, directum caudae aspera, laevi coloris.

Fines omnes scabunt. Membrana pinnarum colore pullo-dictro, maculis laevi, marginibus pili rufi secundum duas series asperi & crassi.

Inflatus impetare cunctas, vociferantur, boantque.

Boant quoties & longaque boant mactur boant, etiam vocem En Enon exoritur.

## PLEURONECTES.

Caput: Oculiambo in eodem hore capitis.

Membr. branch. radiis IV-VII.

Corpus compressum, hore altero dorsum, altero abdomen reficente.

31.

### PLEURONECTES. FLEUS.

Pleuronectes oculis dextris, linea laterali aperta spinulis ad pinna. Linn. Syst. Nat. p. 370.

Pleuronectes, Fleus, oculis dextris, linea laterali aperta: Spinulis ad pinna. Linn. Faun. Suec. no. 327.

Suecia Fladen.

Borussia. Western, Fladen.

Habitat in mari Baltico, aliquando in fovea circa Brandenburgensi. Opuscula nota, qui circa urbem Miscol. captae.

32.

### PLEURONECTES MAXIMUS.

Pleuronectes oculis finifinis, corpore aperto. Linn. Syst. Nat. pag. 371.

Pleuronectes Maximus oculis finifinis corpore aperto. Linn. Faun. Suec. no. 328.

Suecia Botta.

Borussia. Glin-Botta, Botta.

In mari Baltico.

PERCA.

## PERCA

Caput: Opercula squamosa, serrata.  
 Membrana branch. radius VII.  
 Corpus planis spinosis.

33.

## PERCA FLUVIATILIS.

Perca planis dorsibus distinctis: Scanda  
 radis XVI. Linn. Syst. Nat. pag. 289.

Ejundem Faun. Svec. nro. 332.

Perca major, Joest. Hist. Nat. Psk. Tab. 22.

Perca. Que Turck. Ein Teichf. Fisch.  
 4te. Schwed. Thesaur. 544 pag. 442.

Perca vulgaris. Turck. Erveneren. Schell.  
 Fich. pag. 1.

Teichf. Fisch. Aufzucht. Kram.  
 II. An. p. 324.

Turck. Teichf. Boruck.

In fluvios sine ulaque degit.

34.

## LUCIO-PERCA.

Perca planis dorsibus distinctis: Scanda  
 radis 23.

Linn. Syst. Nat. pag. 289.

Ejund. Faun. Svec. nro. 334.

Schell. Joest. Hist. Nat. Psk. Tab. 30.  
 Fig. 15.

Lucio.



Lacis-Percis Cetheri. Adrian Borvialis.  
 On Jeth. Jeth. Ceth. Rognat. Schwenk.  
 Ther. 31. p. 477.

On Jeth. On Jeth. Borvialis.

On Ceth. Aufstacia. Krom. Elsch. An.  
 pag. 385.

East. Gaster, East. Gaster. Staja. Ichthypath.  
 pag. 760.

In fluvio majorebus, loco Curatice &  
 Braudenburgensi copiose capitur.

## 35.

## CERNUA.

Percis pinas dorsibus unius radii 27.  
 spinis 15. cauda bifida. Linn. Syst. Nat. p. 294.

Percis Cernua pinas dorsibus quatuordecim,  
 radius 27. aculeis quatuordecim, cauda bifida.  
 Linn. Faun. Svec. nro. 339.

Percis Borvialis minor. Jeth. Huk. Nat. P.  
 Tab. 28.

Percis rotunda. Percis flaviventris minor,  
 Rognat.

Schwenk. Ther. 31. p. 446.

Plasma. Ceth. Rognat. Aufstacia. Krom.  
 El. An. p. 385.

Percis Borvialis minor. Ceth. Plasma.  
 East. Borvialis. Schaff. H. P. p. 37.

East. Borvialis. Borvialis.

In fluvio & lacibus copiose.

34

## SCHRÆTSEK.

*Percis pinna dorsalis unius, linea corporis alba.*

Lin. Syst. Nat. pag. 234.

Schrætker Fischbuch, Schell. F. H. Brev. pag. 48.

In lacubus stagnationis, ut Jussieu in Ostetia.

---

GASTE.

## GASTEROSTEUS.

Caput.

Membra branchiæ radiis III.

Corpus ad caudam utrinque cœ-  
cinatum.

Aculei distincti ante pinnam dors.

17.

## PUNGITIUS.

Gasterosteus spinis dorsilibus.

Linn. Sp. N. p. 296.

Ejund. Faun. Suec. no. 337.

Pungitus Albert. Jacob. Hill. Nat. Fiss.  
Tab. 25.Spinachia. Pöschelius pungitivus Albert.  
Stockm. Fisch. Zool. Belg. Schwank.  
Terrien. Nat. p. 445.

Pöschel, unicolor.

Sch. de Alm. p. 1007.

Carp. Blaud, Bonifin.

In nemoribus fore ubique.

ABDO.

## ABDOMINALES.

### COBITIS.

Caput: Oculi in superius capitis parte. Membra. branchiost. radiis IV-VI. Opercula inferius clausa.

Corpus fere aequale, sive Cauda versus pinnam minus angustata.

38.

*Cobitis curvis* eris fex., capite laterali compresso, Linn. Syst. Nat. p. 303.

Linn. Faun. Svec. nro. 347.

*Cobitis* corp. glabra maculosa, corpore suberect. Arnd.

*Cobitis barbata*, Jond. Hist. Nat. Pöl. Tab. 26. Fig. 22.

Fundulus seu Fundula, Gmel. Gmeling. Zoonömiel. Schrank. Thierien. Sil. p. 424.

Fundulus. Seb. de ichn. pag. 1004.

Gmeling. Edmeria. Bonell.

Habitus in foveis, rivulis & piscinis.

39.

### TAENIA.

*Cobitis ciria* om. VI. spin. suboculari, Linn. Syst. N. p. 303.

*Cobitis Taenia* aculeo bifurco infra utrumque oculum Arnd. Linn. Faun. Svec. nro. 342. Cobis.

*Cobitis asotus*, *Tetraodon lineatus*. Jour.  
H. Nat. Tab. vol. Plac. 11.

Colinas, A. and J. C. C. de Almeida. 1997.

*Cyrtus aridus*. Siegenfeld. Ess.  
Herm. Stoffe. Dargest. Schwed.  
Ther. 24. pag. 435.

Coburn, Sandra. Kram, El. Asian, Austr.  
pgs. 396.

Conchosa, Conchosa, Perolla,  
In loco Brandenburgis loco arena  
degit.

**FUNDULUS**

Cobitis nasus barbatus, pennis dorsation IX, anal V.

Forfeited. One Credit. Jan. 1882. Feb. 1882.  
Tab. 21. Fig. 13.

Goetz, H. v. d. *Die Erhaltung der Kunst*.  
Halle, 1848, pag. 903.

Gebau bewirkt. *Zeits. Bauwesen*, Schen-  
Ther. 1862. pag. 432.

Gabio Barrios, *Paradise Crossing, Ecuador*, Sch. de Arq. pag. 1006.

Pilae dactyliferae, pinguiculi nigri varietas.  
Piscis cauda brevis pectus variegata. Vulgo  
credunt, hominem cadavera salmuthorum de-  
poscere, sine *dehiscere* normantur. Dele-  
gantur ovesque bubula in thymum coniecta.

### Le complot de l'homme-patrimoine

STL.

## SILURUS.

Caput medium. Os cirris aliquot filiformibus tentaculiformi.

Membr. branch. radiis IV - XIV.

Corpus: Radius pinarum pectoralium aut dorsalis primus spinosus, retrocurvus.

41.

## SILURUS.

*Silurus pinna dorsalis unica, circa VI. Linn. Syst. N. p. 304.*

*Silurus. Glanis. pinna dorsali unica, circa VI. Linn. Faun. Svec. art. 304.*

Quatuor dorsi monopterygia, cirri tentaculiformes superiores duobus inferioribus IV. Arrisi Idem. Siluri vera effigies. Joak. Hall Nat. pict. Tab. 47. Fig. 7.

*Silurus. Vellus. Giesb. Natur. Hist. Schwed. Th. 54. p. 444.*

*Elaf. Boruss.*

In locis Curonici ac Brandenburgici, per sepe in fluvio Pregor, Memel & quodam ceteris capitur.

C

SALMO.

## SALMO.

Caput leve.

Dentes in maxilla, singuli.

Membrana Branch. radiis IV-X.

Corpus: Pinna dorsalis postica ad-  
posita; Finis ventrales macturedant.

42.

## SALAR.

Salmo coltro ultra inferiorum maxillam  
prominentia. Linn. Syst. Nat. p. 308.

Salmo Salar coltro ultra inferiorum maxi-  
llam prominentia. Linn. Faun. Svec. nra. 345.

Salmo. Juss. Hist. Nat. Tab. 23. Fig. 1.

Eten. Pict. Salmo. Cuiusq. Schwenck.  
Theor. Nat. p. 443.

Salmo, in Europ. Mus. Ichthyol. p. 287.  
Euph. Bonellia.

Habitu in Arctia majoribus, nec in utroq;  
que leve.

43.

## ERIOX.

Salmo macula cinerea, caudæ extremitas  
equali.

Linn. Syst. Nat. p. 308.

Salmo Eriox macula cinerea, caudæ ex-  
tremitas equali. Linn. Faun. Svec. nra. 345.

Trutt

*Trachocentrus nigricans* Cuvier, Poiss.  
Schweidf. Thierw. III. p. 449.

*Trach. nigra*. Cuvier, Poiss. Sch. de  
An. p. 1002.

Boralla Fisch-Fishes mit Cuvier-geant  
Fishes von Philadelphia.

Intra alios in foveis habitas.

44

## FARIO

*Salmo macula rubra*, macula inferiore  
sublongiore. Linn. Syst. Nat. p. 309.

*Salmo Fario macula rubra*, macula infe-  
rior sublongiore. Linn. Faun. Svec. art. 142.

Trout, Fario, Fossil, Fost. Fossil. Hist.  
Nat. Tab. 16. Fig. 1.

*Trout lacustris*. Cuv. Fisch-Fish. Cuvier,  
Cuvier, Cuvier, Cuvier, Schweidf.  
Thierw. III. p. 449.

*Trout arca*. Cuv. Poiss. Sch. de An.  
pag. 1002.

Boralla Fisch-Fishes. Fisch-Fishes.  
In foveis habitas.

45

## LACUSTRIS

*Salmo crux lacustris*, macula lacustris ni-  
gra, salco longitudinalis vixima. Linn. Syst.  
Nat. pag. 309.

C 1

Salmo



Salmo maxilla inferiore longior, radiis  
pinne dorsalis XV, duobuscentis, antecod. XVII.

Caput & os magnam,

Oculi ano-cavato, unde rutilo.

Utique supra situm longitudinem  
latera punctis octo nigris, magnitudine pil  
ruginis notata sunt.

Vener catus, ferax.

Longitudo totius piscis fere cubito in-  
venitur.

Barilla Pecten. Pecten. Pecten.

In la. n. Caronico.

46.

## LAVATERUS.

Salmo maxilla superiore longior, radiis  
pinne dorsalis 14. Linn. Syst. Nat. p. 380.

Salmo Lavaterus maxilla superiore longi-  
ore, radiis pinne dorsalis 14. Linn. Faun. Sv. n. 352.

Composita maxilla superiore longior pla-  
na, pinne dorsalis officulorum 14. Arted. Linn.  
Faun. Svco.

Alula nobilis, Juss. Hist. Nat. Tab. 46.  
Fig. 2.

Lavaterus Alulogum Raj.

Alula major & nobilis, Lavaterus Galles-  
orum: Germ. *Waldsch.* *Waldsch.* *Waldsch.*  
us in *Waldsch.*

*Waldsch.* *Waldsch.* *Waldsch.* *Waldsch.*  
p. 343. ubi accurata invenitur descriptio.

*Waldsch.*

*Edenipet. Boroffia.*

In lacu habetur Caronico, nec in fluvio  
Olype ac Nemmesena, qui magni fluvii Me-  
moris sunt afflu.

### <sup>47.</sup> ALBULA.

*Salmo maculis edentulis, inferioris longior.*

*Leop. Syst. Nat. p. 310.*

*Salmo, Albula maculis edentulis inferioris  
longior. Congruus maculis inferioris longi-  
or.* *Arsed. Linn. Faun. Svec. no. 353.*

*Albula maxima. Jonst. Hist. Pict. Tab. 30.*

*Fig. 7.*

*Norlandia & Boroffia Gmel.*

### <sup>48.</sup> THYMALLUS.

*Salmo maculis superiore longior. pinnis  
dorsi radiis 23. Linn. Syst. Nat. p. 311.*

*Salmo Thymallus, maculis superiore lon-  
gior, pinnis dorsi radiis 23. Congruus maculis  
superiore longior, pinnis dorsi radiis 23.*

*Arsed. Linn. Faun. Svec. no. 354.*

*Thymallus. Jonst. Hist. Pict. Tab. 26. Fig.*

*3. 4. 5. 8. Tab. 31. Fig. 6.*

*844. Koen. Elench. Asem. Austr. pag. 360.*

*Thymallus. Gmel. 844. 844. 844. 844.*

*Thymallus. Gmel. 844. 844.*

*Boroffia 844. 844.*

*In lacu Caronico.*

C 3

BOOK.

## ESOX.

Caput supra planiusculum:

Mandibula superiore plana brevior;  
inferiore punctata. Dentes in maxilla  
longi.

Membrana Branch. radiis VIII-XIII.

Corpus elongatum.

49

## LUCIUS.

Esor rostro depresso, subequali. Linn.  
Syst. Nat. p. 314.

Esor, Lucius, rostro depresso subequali.  
Esor rostro pharyngiano Arctid. Linn. Faun.  
Svec. nro 353.

Lucius, Juss. Hist. Nat. Tab. 29. Fig. 1.

Lucius. Loxia. Es. Esch. Schwenck.  
Thesaur. M. pag. 414.

Lucius, Es. Esch. Esch. Ichthyoch.  
pag. 741.

Lucius. Es. Esch. Sch. de Alen. p. 283.

Boralla. Esch.

la lucius, pulchre & doria.

## CLUPEA.

## CLUPEA.

Caput maxillarum superiorum mythe-  
cibus serratis.

Membr. Branch. radiis VIII. Bran-  
chiæ internæ serratae.

Corpus; Abdominis serrata.

Finnæ ventrales sæpe novem radiatae.

90.

## MEMBRAS.

Clupea immaculata, maculis infusis  
longior. Linn. Syst. Nat. pag. 317.

Clupea secunda, Membræ. Linn. Faun.  
Suec. tom. 357.

Membræ. Juss. Ich. Pôl. (Tab. 19.  
Fig. 14.

Svecia Christiania.

Scania Christiania.

In mari Baltico magna in copia capi-  
untur.

Turresd. & senu indanti à Norderboen  
Edling nominantur.

51.

## ZIGA.

Clapca brevifolia immaculata, manilla inflexa longior, pinnæ venteris radius novem, pinnæ æm radius 25. Pinnæ posticalet fere totam sectionum longitudine, radius XIV. XV. compolite.

Cepa, Ziga. Baga. Baga. Ichthyoth. pag. 693.

Baga Nutritum.

Cholo alera Randicki. Que Spring-  
er in Jilin Gen. Just. Hist. Pab. Yab. 30.  
Fig. 13.

Strictio officinatus hella.

In lora Curonico degra.

CYPRIL.

## CYPRINUS.

Caput: ore edentulo: Os nasale bifidum.

Membrana Branch. radiis III.

Corpus leve, albent.

Fimæ ventrales sæpe novemradiaæ.

52.

## BARDUS.

Cyprinus pinna ani radiis VII. circa IV.  
pinne dorsæ radio secundo utraque serrata.  
Linn. Syst. Nat. p. 339.

Burba. Barba. Joub. Hist. Poiss. Tab. 26.  
Fig. 6.

Burba. Barba. Barba. Barba. Barba.  
Rogier introd. in Hist. Natur. Tom. 2. p. 98.

Burba. Barba. Barba. de Alen. 991.

Burba. Barba. Barba. Ichthyoth. p. 826.

53.

## CARPIO.

Cyprinus pinna ani radiis IX. circa IV.  
pinne dorsæ radio secundo pectore serrata.  
Linn. Syst. Nat. pag. 339.

Cyprinus. Carpio. pinna ani radiis IX.  
circa IV. pinne dorsæ radio secundo pectore  
serrata. Linn. Faun. Sv. nro. 339.

C 5

Cypr-

Cyprinus. Jonst. Hist. Pisc. Tab. 19.  
Fig. 3. 4. 6.

Cyprinus. Gise. Europ. Schwed. Thero-  
zoön. 3d. pag. 417.

Europ. Baruffia.

Non solum in piscinis, sed etiam in lacu  
Brandenburgico & Praga habitat.

54

## CARASSIUS.

Cyprinus pinnis uni rostro directis, cauda  
longa, linea laterali recta. Linn. Syst. Nat.  
pag. 331.

Cyprinus, Carassius, pinnis uni rostro X,  
cauda longis, linea laterali recta! Cyprinus  
pinnis uni officulorum viginti linea laterali re-  
cta. Artedi. Linn. Faun. Svec. nro. 364.

Cyprinus huius class. Jonst. Hist. Pisc. Tab.  
97. Fig. 12.

Carass. Carassius. Gise. Europ. Schwed.  
Therozoön. 3d. pag. 424.

Cyprinus arcticus. Gise. Europ. 20da  
Ichthyoth. pag. 332.

Baruffia Baruffa.

In piscinis, fluviis & lacubus degunt.

55

## TINCA.

Cyprinus pinnis uni rostro XXV, cauda  
longa, corporis macula, Linn. Syst. N.  
pag. 331. Cyp

Cyprinus, Tinca, pinnæ ant. radiis 25.  
cauda integra, corpore maculato. Cyprinus  
maculatus, totus nigrescens, extremitatibus cau-  
de æquali breviori. Linn. Faun. Svec. nro. 363.

Tinca. Jonst. Hist. Pisc. Tab. 29. Fig. 7.

Tinca. Koen. Elench. Anim. Austr. p. 382.

Tinca. Merula lacustris. Cuv. Schlegel.  
Schwenck. Theriograph. Sal. pag. 428.

Tinca. De Schlegel. Bijdr. Ichthyoth.  
pag. 328.

Tinca, quasi cauda. Schlegel, Sch. de Alm.  
pag. 1009.

Borussia Schlegel. Schlegel.

in lacubus lacubus, vix in fluvio fundo la-  
cubus prædica.

38.

## CEPHALUS.

Cyprinus pinnæ ant. radiis XI. cauda inte-  
gra, corpore lachrymifero. Linn. Syst. Nat.  
pag. 334.

Cepus flaviventris naxos. Jonst. Hist. Pisc.  
Tab. 26. nro. 8.

Cepus flaviventris naxos. Coradon flavio-  
600.

Cervus flaviventris. Jonst. Hist. Nat. Hist.  
Hist. Schwenck. Theriograph. Sal. p. 423.

Cervus. De Cepus flaviventris. De Koen.  
Bijdr. Ichthyoth. pag. 389.

39.



In lacu Brandenburgico circa Neipen copiose capiuntur, ut et in lacu Curonico.  
*Borealis Neipen.*

57.

## APHYA.

Cyprinus pinus aut rotas IX. latus ruber, corpore pellucido. Linn. Syst. Nat. p. 373.

Cyprinus, *Aphyra*, pinus aut rotas IX. latus ruber, corpore pellucido. Cyprinus tigrinus, latus ruber & pinus aut rotas IX. Linn. Faun. Svec. nra. 374.

Quoy. Journ. Hist. Nat. Tab. 19. Fig. 13.  
*Aphyra* Otter. Cat. Fanger. Introd. in Hist. Natur. pag. 734.

*Borealis Siberica.*

In lacu Curonico, Brandenburgico & Pregile illic copiantur. Uter in rivulis parvis semper obvia periculis, Magnam similitudinem, quoad longitudinem, colorem & habitum corporis exterius cum *Albula*, vulgo *Stur* possidet.

58.

## DOBULA.

Cyprinus pinus aut dorsetique rotas decem Linn. Syst. Nat. pag. 373.

*Squalus major.* Capite fusciscula maxillae cin. hist.

©

On. Nakt. Dädel. Wisse. Schwend.  
Theromorph. Stel. pag. 446.

Care mella stomacho creditur. Hist.  
Schwend.

Was ich die hier bei Dädel,

So findet er alle Stel.

Care das hier colere

Borella Dädel. Dädel. Dädel.

Habes in herbas & fovea.

Stel. Stel. Dädel. Stel. Stel.  
Ichthyol. pag. 84.

39.

# KUTILUS.

Cyprian pennis ani radia XII. rubicunda.  
Linn. Syst. Nat. p. 324.

Cyprian, Kutilus, pennis ani radia XII.  
Cyprian unde pennisque vincta ac ani pla-  
rumpus rubicundus Arrad. Linn. Faun. Svec.  
nro. 372.

Kutilus fovealis Gellert. Jost. Hist. Psk.  
Tab. XXVI.

Kutil. Stel. Dädel. Stel. Stel. Stel. Stel. Stel.  
Alim. p. 1000.

Thryx fovealis fovealis. Bern quod  
Bern. Schwend. Theromorph. Stel. pag. 447.

Borella Bern.  
In herbas & fovea.

## 60.

## IDUS.

Cyprinus pinna an. cauda XIII. rubra Linn.  
Syl. Nat. pag. 324.

Cyprinus, Idus, pinna an. cauda 13. rubra.

Cyprinus inde: sublesus, pinna venter-  
bus unguis rubris Arnach. Linn. Faun. Suec.  
an. 365.

Saxo id.

Borussia Pöthen.

Wetling. Cybus. Boettger. Aofstach.  
Kram. Fluch. Arins. Aofst. pag. 394.

Hesperus in flavis & luteis.

## 61.

## ERYTHROPHTHALMUS.

Cyprinus pinna an. cauda XIV. pinna r-  
bida.

Linn. Syl. Nat. pag. 324.

Cyprinus, Erythrophthalmus, pinna r-  
cauda 14. rubra. Cyprinus inde pinna oca-  
bus unguis rubris Arnach. Linn. Faun. i  
an. 366.

Kobell. Kufus. Mink. Wetling.  
Schrank. Thierm. Sied. pag. 443.

Bojsenp. Borussia.

Vita & vulgata pifca.

Daga in ocellis fere flavis.

Rado. Bojsenp. Boft. Ichthyoth. p. 3.

62.

## JESES.

*Cyprinus plius* an. radis XIV. rostro re-  
tundus.

Linn. Syst. Nat. pag. 325.

*Cyprinus cubitalis*, pinna an. officulorum.

14.

*Cyprus floridulus catulorum*. Gise. Zool. Zool.  
Zoolog. Schenkels. Theriograph. Soli p. 423.

*Leuciscus brachialibus ventris & auribus*.

Göln. Zöln. Gölz. Zölz. Zölz. Zölz. Zölz.

pag. 669. & 321.

*Borealis*. Zöln. Gölz.

In fluvio.

63.

## ASPIUS.

*Cyprinus plius* an. radis XVI. maxilla in-  
feriore longiore incurva. Linn. Syst. Nat. p. 325.

*Cyprinus*, *Aspius*, pinna an. officulorum  
XVI. maxilla inferiore longiore incurva. Linn.

Finn. Svec. nro. 164.

*Cyprinus* maxilla inferiore longiore cum  
apice elevato; pinna an. officulorum XV.

Svec. Asp.

*Borealis*. Zölz. Soli.

Ex lacu Carusico abeundit pinna vire in-  
flavio, itaque tunc capiam.

64.

## 64

## ALBURNUS.

Cyprinus pinna seu rubus XX. Linn. Syst. Nat. p. 323.

Cyprinus, Alburnus, pinna seu rubus XX.

Cyprinus quinquaculus, pinna seu officinarum XX.

Linn. Faun. Svec. nro. 373.

Alburnus Asiatæ, Juss. Hist. Nat. Tabac.

Fig. 5.

Alburnus. Alburnus carolinæ. Cuv. Osteol. Osteol.

Schweidts Thierreich. Nat. pag. 414.

Alburnus carolinæ. Broda, germ. Blaufisch.  
Holl. Blaufisch. Brasilië. Weiß. Rogen. In-  
trod. in Hist. Natur. pag. 343.

Koning van Afschaling Boreia.

Parallèle Histoire.

Lithurus scabellus.

Ulla. Dicht. Ichthyoth. pag. 327.

Huiley secundum linguam Slavonicam  
schelom significat Leuciscus, nro olim Blau-  
fisch. Item.

## 65.

## MURÆNULA.

Cyprinus pinna seu XII. & dorsalis IX.

Muræna. Truncus edentulis non argenteis  
cyanis squibus, inferiore mandibula reflexa  
Alba

*Akula Silesiaca*. Barden. *Bojerum*. Nostr.,  
Naja. Ichtyoch. pag. 896.

*Merenda Silesiaca lacustris*. *Albacula*  
*lacustris*.

*Stenolepis*, ab oppido Marchie Moryn;  
ubi frequenter quasi capræ. *Stenon*. *Stenon*.

*Pisces* est *lacustris*, *spumatus*, ex *Alburno-*  
*rum* genere, qui vulgo *Ostrea*, quibusdam  
& *magnatibus* respondet. *Halobius* fere  
similis &c.

Hec *Schwenkfeldius* in suo *Theriotropho*  
Sicil. pag. 437.

*Pisces* *delicati* & *cervi*.

*Stenon* *Bonellia*.

*Halobius* in *lacubus* *fluminibus* *Polonia*  
*Bonellia*, ibi *hibens* *tempore* *magna* *cap-*  
*ta* *in* *copie*.

## 66.

## BRAMA.

*Cypselus* *plana* *an* *radio* XXVII. *plana*  
*falsa*.

*Linn. Syst. Nat. pag. 306.*

*Cypselus*, *Brama*, *plana* *an* *radio* XXVII.  
*plana* *falsa*.

*Cypselus* *plana* *ortus* *nigricostatus*; *plana*  
*an* *officinarum* *viginti* *septem* *Arce*.

*Linn. Faun. Svec. nra. 160.*

D

Cypsel-

*Cyprinus lotus*. Juss. Hist. Nat. Tab. 13  
Fig. 7.

Pradara. Abruzzi Ravenna. Roma. 82  
Zoofig. Zoológica. Zool. Schenck Thes-  
aur. Nat. p. 480.

Cassini. Austria. Kraus. Fisch. An-  
stalt. p. 391.

Berlin. Borussia.  
In doria & locustis.

67.

## GIEBEN.

*Cyprinus pinna* an. 13. dorsi 8. pinnæ  
omnes subulæ, uti subulæ. Longitudi-  
nem pinnæ ad VIII. unius extremit. Dors.  
an. 13.

In fluvio degunt.  
Borussia Silesia.

68.

## FARENUS.

*Cyprinus pinna* an. XXVII. iride flav.  
Linn. Syst. Nat. pag. 336.

*Cyprinus Farenus*, pinna an. red  
XXXVII. irides flavæ. Linn. Faun. Svec-  
ica. 369.

Japan, Borussia.  
Sport. Linnæus.

Sve

*Svecla Faren.*

Habitat in lacu Caronico, atrediti verus  
tempore flumine adjacentem.

69.

# BALLERUS.

*Cyprinus pinna* an. 40. Linn. Syst. Nat.  
pag. 366.

*Cyprinus, Ballerus, pinna* an. officio-  
rum 40.

*Cyprinus* admodum latus & tenuis, pinna  
an. officiosum quodraginta Arvid. Linn.  
Faun. Svec. pag. 366.

*Ballerus, Pinna.* Hist. Juss. Hist. Nat.  
Tab. 27. Fig. 7.

*Alburnus Albus.* An. Godefr. Godefr.  
Godefr. Schwab. Theriograph. Nat. p. 414  
An. Godefr. Godefr. an. Godefr. Godefr.  
In lacubus & fluvius habitant.

D 1

V.



## V. BRANCHIOSTEGI, SYGNATUS

Caput: Rostrum; subcylindricum, on  
operculato maxilla inferiore.

Apertura branchiarum operculi clo-  
sis; nucha foraminis spirans.

Corpus articulare.

Pinnæ ventrales nullæ.

### <sup>70.</sup> A C U S.

*Sygnatus pinnis caudæ ani pectoralibusque  
radiatis, corpore septem-angulo. Linn. Syst.  
Nat. p. 337.*

*Sygnatus. Acus, pinnis caudæ, ani, pe-  
ctoralibusque radiatis, corpore septemangulo.*

*Sygnatus corpore recto heptagono caudæ  
pinnati. Anon. Linn. Faun. Svec. nro. 375.*

*Acus vulgaris. Reupr. introd. in Not. Rer.  
Naturæ. pag. 210.*

*Acus, Just. Hist. Nat. Tab. 15.*

*Wiesm. Hist. Esqu. ibid.*

*Berylla. Gleditsch. Gad. Gled.*

*Sveia Kænnehl.*

*Cera leprosa maris Balici.*

*Inferis pisciventibus pro cibo.*

*Inprimis pro ceteris ad gubæ capiendos: I  
venatur pisciventer.*

71.

## OPHIDION.

*Syngnatus caudæ et pectoralibusque nullis, corpore neri.* Linn. Syst. Nat. pag. 337.

*Syngnatus, Ophidion, pinna caudæ, et pectoralibusque nullis, corpore neri.*

*Syngnatus neri, pinna pectoralibus, caudæque cauda.* Arted. Linn. Pisc. Svec. n. 375.

Habitar ad litora maris Baltici.

Piscarum pro eis ad allicandos & capiendos gulos esse utitur.

Novella. Grev.

Serus Rafineschi.

F I N I S



INDEX.





## Q.

Quadronia, 70.

## R.

Rana uloria, 13.  
     bordera, 9.  
     silvatica, 12.  
     rubra, 12.  
     temporalis, 12.  
     variegata, 9.

Ranella, 21.

Rana, 10.

Rana, 12-16.

## S.

Salamandra, 6.

Sala, 42.

Salmo, 42-47.

Salmu, 14.

Salmu, 16-21.

Salmu, 17.

Salmu, 22-24.

Salmu, 25.

Salmu, 70-71.

## T.

Tadpole, 1.

Tadpole, 38.

Tadpole, 42.

Tadpole, 14.

Tadpole, 21.

Tadpole, 42-43.

Tadpole, 44.

Tadpole, 15.

## V.

Vadole, 14.

Vadole, 14.

Vadole, 17.

Vadole, 18.

Vadole, 17.

## X.

Xadole, 14.

## Z.

Zadole, 12.





**D.**

Dine, 4.

Dine, 1b

**D.**

Dine, 12.

Dine, 45.

Dine, 45.

Dine, 45.

Dine, 45.

Dine, 12.

Dine, 12.

Dine, 12.

Dine, 12.

Dine, 12.

Dine, 12.

Dine, 12.

Dine, 12.

Dine, 12.

**D.**

Dine, 12.

**D.**

Dine, 12.

Dine, 12.

Dine, 12.

Dine, 12.

Dine, 12.

Dine, 12.

Dine, 12.

Dine, 12.

**E.**

Eine, 7.

Eine, 4.

Eine, 12.

Eine, 41.

Eine, 12.

Eine, 41.

Eine, 12.

Eine, 12.

Eine, 12.

Eine, 12.

Eine, 12.

Eine, 12.

Eine, 12.

Eine, 12.

Eine, 12.

Eine, 12.

Eine, 12.

Eine, 12.

Eine, 12.

Eine, 12.

Eine, 12.

Eine, 12.

Eine, 12.

Eine, 12.

Eine, 12.

Eine, 12.

Eine, 12.

Eine, 12.

Eine, 12.

Eine, 12.

Eine, 12.



Gey. 12.  
 Gey. 14.  
 Gey. 50.  
 Gey. 10.  
 Gey. 10.  
 Gey. 70.

### II.

Gey. 10.  
 Gey. 10.  
 Gey. 1.  
 Gey. 10.  
 Gey. 10.  
 Gey. 10.  
 Gey. 10.  
 Gey. 10.

### III.

Gey. 10.  
 Gey. 10.

### IV.

Gey. 10.

Gey. 10.  
 Gey. 10.

Gey. 10.  
 Gey. 10.

Gey. 10.  
 Gey. 10.

Gey. 10.  
 Gey. 10.

Gey. 10.

### V.

Gey. 10.

### VI.

Gey. 10.  
 Gey. 10.  
 Gey. 10.  
 Gey. 10.  
 Gey. 10.  
 Gey. 10.

